

PCEA Patient controlled epidural analgesia

Es handelt sich um eine moderne Form der Schmerzbehandlung bei der Sie sich selbst über eine Pumpe Schmerzmittel zuführen können. Diese patientenkontrollierte Methode ist bestens geeignet, Ihr Wohlbefinden zu fördern entweder bei der Geburt Ihres Kindes, nach einem schmerzhaften operativen Eingriff, bei starken chronischen Schmerzen oder bei Schmerzen während einer Krebserkrankung.

Indikationen

- Geburtshilfe
- Nach schmerzhaften Operationen
- Bei chronischen Schmerzen, zum erneuten Erlangen einer stabilen Schmerzsituation
- Bei Tumorschmerzen in der Onkologie
- Wenn Sie Wert auf eine eigenständige Schmerzkontrolle legen

Ziele

- Eigenständige und unabhängige Möglichkeit der Schmerzkontrolle
- Kontinuierliche Schmerzmittelgabe und Ergänzung durch Ihre selbstbestimmte Schmerzmittelgabe
- Angepasste Schmerztherapie an Ihren individuellen Bedarf
- Gute Schmerzlinderung bis Schmerzfreiheit
- Beschleunigung Ihrer Genesung und Wiederherstellung Ihrer Autonomie

Funktionsweise

- Anschluss der Schmerzpumpe an den epiduralen Katheter mit einer kontinuierlichen Schmerzmittelgabe und mögliche Ergänzung durch Ihre selbstbestimmte Schmerzmittelgabe per Druckknopf
- Wirkungseintritt nach wenigen Minuten
- Die Schmerzmitteldosis wird vom Anästhesisten festgelegt.

- Die Schmerzpumpen verfügen über ein Sicherheitssystem welche eine Überdosierung des Lokalanästhetikums verhindern.
- Überwachung durch das Fachpersonal
- Gleichberechtigte Kommunikation und Kooperation zwischen Ihnen/Familie und dem Fachpersonal

Mögliche Nebenwirkungen

Sensibilitätsstörungen, Kribbeln

- Koordinationsstörungen durch sensible und/oder motorische Blockade
- Vorübergehende Muskelschwäche
- Geh- und Stehfähigkeit kann vorübergehend beeinträchtigt sein
- Kreislaufreaktionen z.B. Blutdruckabfall
- Blasenfunktionsstörungen, erschwerte Blasenentleerung

Anwendungsdauer

3 – 5 Tage

- Individuelle Anpassung

Schmerzmessung: Die Schmerzmessung erfolgt über eine numerische Schmerzskala von 0 - 10.



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen.

Centre Hospitalier du Nord
+352 8166-1

PCEA Analgésie péridurale contrôlée par le patient

Forme moderne et procédé standard de traitement de la douleur contrôlé par le patient. Il s'agit d'une méthode parfaitement adaptée pour favoriser votre bien-être lors d'un accouchement, après une intervention chirurgicale douloureuse, en cas de douleurs chroniques importantes ou en cas de douleurs dues à un cancer.

Indications

- aide à l'accouchement
- après une opération douloureuse
- en cas de douleurs chroniques, pour retrouver un niveau de soulagement stable
- en cas de douleurs cancéreuses en oncologie
- si vous souhaitez contrôler la douleur de manière autonome.

Objectifs

- contrôle de la douleur de façon autonome et indépendante
- administration d'analgésiques de façon continue, avec la possibilité de s'auto-administrer des bolus d'analgésiques en cas de besoin
- adaptation du traitement de la douleur à vos besoins individuels
- bonne prise en charge de la douleur, voire absence de douleur
- accélération du processus de guérison et restauration plus rapide de votre autonomie

Le fonctionnement de la pompe

- Raccordement de la pompe PCEA au cathéter épidural, avec administration continue d'analgésiques,

et auto-administration autonome d'analgésiques par bouton-pression possible en complément.

- Action rapide après quelques minutes
- La dose d'analgésique est déterminée par l'anesthésiste.
- Les pompes PCEA disposent d'un système de sécurité qui empêche un surdosage de l'anesthésique local.
- Suivi par un personnel qualifié
- Communication et coopération sur un pied d'égalité entre vous /votre famille et le personnel qualifié



Effets secondaires possibles

- troubles de la sensibilité, fourmillements
- troubles de la coordination dus à un blocage sensitif et/ou moteur
- faiblesse musculaire passagère
- la capacité de marcher et de se tenir debout peut être temporairement affectée
- légers troubles circulatoires, p. ex. chutes de tension
- troubles de la fonction vésicale, difficultés de miction

Durée d'utilisation

- 3 à 5 jours
- adaptation individuelle.

Évaluation de la douleur : évaluation à l'aide d'une échelle de la douleur (0-10) numérique.



Scannez le code QR pour plusieurs informations.

Centre Hospitalier du Nord
+352 8166-1