

PCEA analgésie péridurale contrôlée par le patient

Forme moderne et procédé standard de traitement de la douleur contrôlé par le patient, il s'agit d'une méthode parfaitement adaptée pour favoriser votre bien-être lors d'un accouchement, après une intervention chirurgicale douloureuse, en cas de douleurs chroniques importantes ou de douleurs dues à un cancer.

Qu'est-ce qu'une pompe PCEA ?

C'est une pompe électrique reliée à votre cathéter péridurale, par lequel des analgésiques sont perfusés en continu et grâce auquel vous pouvez vous administrer des analgésiques supplémentaires de manière autonome en appuyant sur un bouton-pression. L'objectif est de rendre la douleur supportable pour vous.

Quel est l'analgésique administré ?

Nous utilisons un anesthésique local qui agit rapidement et qui peut traiter efficacement la douleur. En raison de la faible concentration des anesthésiques locaux, la force musculaire est généralement conservée, du moins en partie (péridurale déambulatoire).

Et si je m'administre trop d'analgésique ?

Les pompes à médicament disposent d'un système de sécurité qui empêche un surdosage d'analgésique. De plus, le personnel soignant assure une surveillance compétente.

Evaluation de la douleur

Vos douleurs sont évaluées 2x/poste à l'aide d'une échelle numérique allant de 0 à 10. La dose des médicaments est adaptée en fonction de la douleur.

Pourrais-je devenir dépendant ?


L'utilisation d'anesthésiques locaux n'entraîne pas de dépendance.

Quels sont les éventuels effets secondaires ?

Le traitement de la douleur est ajusté individuellement de manière à réduire au maximum les effets secondaires ; dans de rares cas, des fourmillements, une faiblesse musculaire passagère et des problèmes urinaires peuvent se produire.

Quels sont les avantages de la pompe ?

Vous avez la possibilité de contrôler votre douleur de manière autonome et indépendante et de déterminer individuellement la dose de vos médicaments, ce qui accélère le rétablissement et favorise l'autonomie en toute sécurité.



Scannez le QR-code
pour des informations
plus détaillées

Centre Hospitalier du Nord
+352 8166-1

PCEA Patient Controlled Epidural Analgesia

Es handelt sich um eine moderne Form der Schmerzbehandlung bei der Sie sich selbst über eine Pumpe Schmerzmittel zuführen können. Diese patientenkontrollierte Methode ist bestens geeignet, Ihr Wohlbefinden zu fördern entweder bei der Geburt Ihres Kindes, nach einem schmerhaften operativen Eingriff, bei starken chronischen Schmerzen oder bei Schmerzen während einer Krebserkrankung.

Was ist eine PCEA-Pumpe?

Eine elektrische Pumpe, angeschlossen an den Periduralkatheter durch die kontinuierlich Schmerzmittel verabreicht wird. Sie können sich selbstbestimmt durch Knopfdruck zusätzlich Schmerzmittel zuführen. Ein erträgliches Schmerzniveau soll dadurch erreicht werden.

Welche Schmerzmittel werden benutzt?

Wir benutzen ein Lokalanästhetikum, welches schnell wirkt und die Schmerzen effektiv behandeln kann. Aufgrund der geringen Konzentration der Lokalanästhetika bleibt die Muskelkraft in der Regel zumindest teilweise erhalten (walking PDA).

Kann ich zu viel Schmerzmittel bekommen?

Die Schmerzpumpen verfügen über ein Sicherheitssystem, das eine Überdosierung des Schmerzmittels verhindert. Außerdem erfolgt eine kompetente Überwachung durch das Pflegepersonal.

Schmerzmessung

Die Schmerzen werden 2 mal pro Schicht über eine numerische Schmerzskala von 0 - 10 abgefragt und mit den begleitenden Schmerzmitteln abgestimmt.

Kann ich abhängig werden?

Die Anwendung von Lokalanästhetika führt nicht zu einer Abhängigkeit.

Gibt es Nebenwirkungen?

Die Schmerzbehandlung wird individuell so eingestellt, dass die Nebenwirkungen auf ein Minimum reduziert werden können. In seltenen Fällen können Kribbeln, vorübergehende Muskelschwäche und Probleme beim Wasserlassen auftreten.

Was ist der Vorteil der PCEA-Pumpe?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Schmerzen eigenständig und unabhängig zu kontrollieren und Ihre Medikamentendosis sicher und individuell zu bestimmen, wodurch die Genesung beschleunigt und die Autonomie gefördert wird.



Scannen Sie den
QR-Code für weitere
Informationen

Centre Hospitalier du Nord
+352 8166-1

PCEA Analgésie péridurale contrôlée par le patient

Forme moderne et procédé standard de traitement de la douleur contrôlé par le patient. Il s'agit d'une méthode parfaitement adaptée pour favoriser votre bien-être lors d'un accouchement, après une intervention chirurgicale douloureuse, en cas de douleurs chroniques importantes ou en cas de douleurs dues à un cancer.

Indications

- aide à l'accouchement
- après une opération douloureuse
- en cas de douleurs chroniques, pour retrouver un niveau de soulagement stable
- en cas de douleurs cancéreuses en oncologie
- si vous souhaitez contrôler la douleur de manière autonome.

et auto-administration autonome d'analgésiques par bouton-pression possible en complément.

- Action rapide après quelques minutes
- La dose d'analgésique est déterminée par l'anesthésiste.
- Les pompes PCEA disposent d'un système de sécurité qui empêche un surdosage de l'anesthésique local.
- Suivi par un personnel qualifié
- Communication et coopération sur un pied d'égalité entre vous /votre famille et le personnel qualifié

Objectifs

- contrôle de la douleur de façon autonome et indépendante
- administration d'analgésiques de façon continue, avec la possibilité de s'auto-administrer des bolus d'analgésiques en cas de besoin
- adaptation du traitement de la douleur à vos besoins individuels
- bonne prise en charge de la douleur, voire absence de douleur
- accélération du processus de guérison et restauration plus rapide de votre autonomie



Effets secondaires possibles

- troubles de la sensibilité, fourmillements
- troubles de la coordination dus à un blocage sensitif et/ou moteur
- faiblesse musculaire passagère
- la capacité de marcher et de se tenir debout peut être temporairement affectée
- légers troubles circulatoires, p. ex. chutes de tension
- troubles de la fonction vésicale, difficultés de miction

Durée d'utilisation

- 3 à 5 jours
- adaptation individuelle.

Évaluation de la douleur : évaluation à l'aide d'une échelle de la douleur (0-10) numérique.



Scannez le code QR
pour plusieurs
informations.

Centre Hospitalier du Nord
+352 8166-1

PCEA Patient controlled epidural analgesia

Es handelt sich um eine moderne Form der Schmerzbehandlung bei der Sie sich selbst über eine Pumpe Schmerzmittel zuführen können. Diese patientenkontrollierte Methode ist bestens geeignet, Ihr Wohlbefinden zu fördern entweder bei der Geburt Ihres Kindes, nach einem schmerhaften operativen Eingriff, bei starken chronischen Schmerzen oder bei Schmerzen während einer Krebserkrankung.

Indikationen


- Geburtshilfe
- Nach schmerhaften Operationen
- Bei chronischen Schmerzen, zum erneuten Erlangen einer stabilen Schmerzsituation
- Bei Tumorschmerzen in der Onkologie
- Wenn Sie Wert auf eine eigenständige Schmerzkontrolle legen

Ziele

- Eigenständige und unabhängige Möglichkeit der Schmerzkontrolle
- Kontinuierliche Schmerzmittelgabe und Ergänzung durch Ihre selbstbestimmte Schmerzmittelgabe
- Angepasste Schmerztherapie an Ihren individuellen Bedarf
- Gute Schmerzlinderung bis Schmerzfreiheit
- Beschleunigung Ihrer Genesung und Wiederherstellung Ihrer Autonomie

Funktionsweise

- Anschluss der Schmerzpumpe an den epiduralen Katheter mit einer kontinuierlichen Schmerzmittelgabe und mögliche Ergänzung durch Ihre selbstbestimmte Schmerzmittelgabe per Druckknopf
- Wirkungseintritt nach wenigen Minuten
- Die Schmerzmitteldosis wird vom Anästhesisten festgelegt.



Scannen Sie den
QR-Code für weitere
Informationen.

- Die Schmerzpumpen verfügen über ein Sicherheitssystem welche eine Überdosierung des Lokalanästhetikums verhindern.
- Überwachung durch das Fachpersonal
- Gleichberechtigte Kommunikation und Kooperation zwischen Ihnen/Familie und dem Fachpersonal

Mögliche Nebenwirkungen

Sensibilitätsstörungen, Kribbeln

- Koordinationsstörungen durch sensible und/oder motorische Blockade
- Vorübergehende Muskelschwäche
- Geh- und Stehfähigkeit kann vorübergehend beeinträchtigt sein
- Kreislaufreaktionen z.B. Blutdruckabfall
- Blasenfunktionsstörungen, erschwerete Blasenentleerung

Anwendungsdauer

3 – 5 Tage

- Individuelle Anpassung

Schmerzmessung: Die Schmerzmessung erfolgt über eine nummerische Schmerzskala von 0 - 10.

